

## Statistik om aborter 2018

**Under 2018 rapporterades knappt 36 000 aborter till Socialstyrelsen, vilket motsvarar 19 per 1 000 kvinnor i åldern 15–44 år. De flesta, 57 procent, utfördes före vecka 7 i graviditeten. Medicinsk metod användes vid 93 procent av alla aborter under 2018 och allt fler medicinska aborter avslutas i hemmet.**

### 2020-06-10 korrigerade uppgifter för 2018


Vissa uppgifter för 2018 års abortstatistik har blivit korrigerade på grund av ett upptäckt inläsningsfel. Endast uppgifter för 2018 är påverkade. Det totala antalet aborter för 2018 är inte påverkat. Följande uppgifter har blivit påverkade för 2018: åldersgrupp, graviditetsvecka, abortmetod samt tidigare antal utförda aborter. De tabeller som har påverkats har också korrigerats. Läs mer om detta i fliken 'Om statistiken' i publicerad tabell för 2018.

## Antalet aborter

År 2018 rapporterades knappt 36 000 aborter, motsvarande cirka 19 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder i befolkningen (15–44 år). Föregående år rapporterades närmare 20 aborter per 1 000 kvinnor. Det är svårt att säga om den lägre nivån 2018 speglar en faktisk minskning av antalet aborter eller beror på större bortfall i rapporteringen.

## Ökning av andelen tidiga aborter

Sedan början av 1990-talet utförs allt fler aborter tidigt i graviditeten. År 1994 utfördes 55 procent av aborterna före vecka 9 och 10 procent före vecka 7. Under 2018 var motsvarande andelar 85 procent före vecka 9 och 57 procent före vecka 7. En förklaring till att aborter görs allt tidigare under graviditeten är införandet av medicinsk abortmetod och förkortade väntetider på ett flertal kliniker. Andelen aborter från vecka 12 och senare har legat på samma nivå under perioden.



## Allt fler hemaborter över tid

Medicinsk abortmetod har blivit allt vanligare sedan metoden infördes i början av 1990-talet. De två senaste åren har 93 procent av de rapporterade aborterna utförts med medicinsk metod och 7 procent med kirurgisk metod.


### Medicinsk abortmetod

Graviditeten avbryts genom läkemedelsbehandling i två steg. Den första tabletten motverkar effekten av progesteron, som är det graviditetsbevarande hormonet, och gör livmodern mer mottaglig för den fortsatta läkemedelsbehandlingen. Efter en till tre dagar tas andra omgången tabletter som framkallar livmodersammandragningar och leder till att graviditeten stöts ut. Metoden kan användas vid alla graviditetslängder då abort är tillåten. Den första tabletten ges alltid på sjukhus/klinik medan behandlingen med de väckstimulerande tabletterna kan ske antingen på sjukhus/klinik eller i hemmet/annan plats, så kallad hemabort.

### Kirurgisk abortmetod

Graviditeten avbryts på sjukhus/klinik genom farmakologisk förbehandling av livmoderhalsen och instrumentell utrymning av livmodern, så kallad vakuumaspiration. Kirurgisk abort kan göras till graviditetsvecka 12 eller 13. Före graviditetsvecka 7 ökar risken för ofullständig abort.


Så kallad hemabort har blivit allt vanligare sedan det blev tillåtet år 2004. Under 2018 var 78 procent av aborterna som utfördes före vecka 9 hemaborter, jämfört med 68 procent under 2015.

**Figur 2. Aborter före vecka 9 efter metod, 2015 och 2018**

Källa: Statistik om aborter, Socialstyrelsen.

## Aborter bland yngre kvinnor minskar

Bland yngre kvinnor har aborterna minskat stadigt under den senaste tioårsperioden. År 2018 rapporterades cirka 11 aborter per 1 000 i åldersgruppen 15–19 år och det motsvarar mer än en halvering från år 2009. Minskningen antas bero på mer utvecklade preventivmetoder och ekonomiska subventioneringar av preventivmedel. Abort är vanligast bland kvinnor i åldern 20–29 år men antalet har på senare år minskat även i denna åldersgrupp.

**Figur 3. Antal aborter per 1 000 kvinnor efter ålder, 1994–2018\***


\* Data saknas för 2013 p.g.a. uppehåll i datainsamlingen. Ny metod för datainsamling från 2014.  
 \*\* Per 1 000 kvinnor 15-19 år resp. 40-44 år.

Källa: Statistik om aborter, Socialstyrelsen.

Andelen medicinska aborter är ungefär lika hög i alla åldrar men det är mindre vanligt bland yngre kvinnor att aborten fullföljs i hemmet. Av aborterna under

2018 som utfördes före vecka 9 var andelen hemaborter 48 procent bland kvinnor 19 år eller yngre, 75 procent i åldersgruppen 20–24 år och drygt 80 procent för kvinnor i åldern 25 år och äldre.

**Figur 4. Aborter före vecka 9 efter metod och ålder, 2018**



Källa: Statistik om aborter, Socialstyrelsen

### Graviditetslängd

Beräknas med ultraljudsundersökning eller efter sista menstruationens första dag till dag för abort. Anges som fullgångna graviditetsveckor + dagar. Exempelvis anges 7 fullgångna veckor + 1 dag som 7+1 veckor.

### Mer information

Du hittar fler tabeller, diagram och annan information i Excel-filen:  
[www.socialstyrelsen.se](http://www.socialstyrelsen.se).

I syfte att försvåra möjligheterna till bakvägsidentifiering av enskilda förändrades insamlingsrutinerna 2014. Som en följd av detta försämrades dock möjligheterna till granskning och bortfallskontroll. En mer fullständig redogörelse för detta finns i Excelfilens flik Om statistiken.

För dig som vill göra egna sökningar i statistikdatabasen:  
<http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/abort>

### Kontakt:

Robert Linder, statistikfrågor  
Telefon: 075-247 34 64  
E-post: [Robert.Linder@socialstyrelsen.se](mailto:Robert.Linder@socialstyrelsen.se)

Inga-Maj Andersson, sakfrågor  
Telefon: 075-247 35 03  
E-post: [Inga-Maj.Andersson@socialstyrelsen.se](mailto:Inga-Maj.Andersson@socialstyrelsen.se)